



NA BADANIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO REJESTRACJI 15 MINUT PRZED BADANIEM

Przygotowanie do badania TK z kontrastem:

1. Przed badaniem TK z kontrastem konieczne jest przedstawienie **wyniku poziomu kreatyniny**, nie starszego niż 3 tygodnie przed badaniem TK.
2. Pozostać **bez jedzenia i picia 6 godzin przed badaniem**.
3. Dostarczyć **dokumentację dotyczącą wcześniej wykonywanych badań** obrazowych TK, RM, RTG oraz USG.
4. Badanie z podaniem środka cieniującego **wymaga zgody pacjenta na podanie środka cieniującego**.
5. W przypadku **cukrzycy leczonej Metforminą** (np. Formetic, Glucophage, Gluformin, Metfogamma, Metformax, Metformin, Siofor, Metral, Metifor, Avamina, Etform) **lek ten odstawić w dniu badania i 48 godzin po badaniu**.
6. **W przypadku nadczynności tarczycy** należy przynieść zaświadczenie od lekarza endokrynologa o braku przeciwwskazań do przyjęcia kontrastu jodowego.
7. **W ciągu 24 godzin po badaniu** należy wypić minimum 2 litry niegazowanej wody.
8. **Prowadzenie pojazdów oraz obsługa urządzeń mechanicznych jest niewskazana przez 1 godzinę po podaniu kontrastu**.
9. Na badanie jamy brzusznej należy przyjść **1 godzinę wcześniej oraz zabrać 1.5 l wody niegazowanej**

Data i godzina badania

Potwierdzam przyjęcie oryginału skierowania.....



NA BADANIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ DO REJESTRACJI 15 MINUT PRZED BADANIEM

Przygotowanie do badania TK z kontrastem:

1. Przed badaniem TK z kontrastem konieczne jest przedstawienie **wyniku poziomu kreatyniny**, nie starszego niż 3 tygodnie przed badaniem TK.
2. Pozostać **bez jedzenia i picia 6 godzin przed badaniem**.
3. Dostarczyć **dokumentację dotyczącą wcześniej wykonywanych badań** obrazowych TK, RM, RTG oraz USG.
4. Badanie z podaniem środka cieniującego **wymaga zgody pacjenta na podanie środka cieniującego**.
5. W przypadku **cukrzycy leczonej Metforminą** (np. Formetic, Glucophage, Gluformin, Metfogamma, Metformax, Metformin, Siofor, Metral, Metifor, Avamina, Etform) **lek ten odstawić w dniu badania i 48 godzin po badaniu**.
6. **W przypadku nadczynności tarczycy** należy przynieść zaświadczenie od lekarza endokrynologa o braku przeciwwskazań do przyjęcia kontrastu jodowego.
7. **W ciągu 24 godzin po badaniu** należy wypić minimum 2 litry niegazowanej wody.
8. **Prowadzenie pojazdów oraz obsługa urządzeń mechanicznych jest niewskazana przez 1 godzinę po podaniu kontrastu**.
9. Na badanie jamy brzusznej należy przyjść **1 godzinę wcześniej oraz zabrać 1.5 l wody niegazowanej**

Data i godzina badania

Potwierdzam przyjęcie oryginału skierowania.....